

# Clindamazol®

کرم واژینال کلیندامازول ترکیبی از داروی کلیندامایسین (۲٪) و کلوتریمازول (۲٪) به عنوان ماده موثره می‌باشد. کلوتریمازول یک داروی ضد قارچ وسیع‌الطیف است که در درمان عفونت‌های قارچی و کاهش خارش و سوزش واژینال ناشی از مخمرها مورد استفاده قرار می‌گیرد. کلیندامایسین نوعی آنتی‌بیوتیک است که برای درمان شماری از عفونت‌های باکتریایی واژینال استفاده می‌شود. ترکیب این دو دارو در کرم واژینال کلیندامازول به درمان همزمان عفونت‌های واژینال قارچی و باکتریایی کمک می‌کند.

درمان همزمان عفونت‌های قارچی و باکتریایی | استفاده از یک دارو به جای دو دارو



کلیندامایسین ۲ درصد  
کلوتریمازول ۲ درصد



تصویر را با دوربین موبایل اسکن کنید

[www.sinapishgamdarou.com](http://www.sinapishgamdarou.com)

تلفن: ۰۲۱ ۸۸۳۳۷۶۹۸

تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان چهارم،  
پلاک ۲۸، ساختمان سینا

سینا  
پیشگام  
دارو نوین





# کلیندامازول<sup>®</sup>



کلیندامایسین ۲ درصد  
کلوتریمازول ۲ درصد

## مزایا:

- درمان همزمان عفونت‌های قارچی و باکتریایی
- استفاده از یک دارو به جای دو دارو
- مصرف آسان
- دارای ۷ اپلیکاتور یکبار مصرف جهت رعایت بهداشت

## موارد منع مصرف

- در صورت داشتن سابقه حساسیت به کلیندامایسین، لینکومایسین، کلوتریمازول، ایتراکونازول، فلوکونازول و سایر ضد قارچ‌های این دسته دارویی (آزول‌ها) از مصرف دارو خودداری کنید.

## هشدارها و احتیاطات مصرف

- طول دوره درمان خود را حتی در صورت شروع قاعدگی کامل ننمایید.
- در صورت بروز اسهال یا حساسیت در طی دوره درمان یا پس از آن، مصرف دارو را فوراً قطع و به پزشک مراجعه نمایید.
- کلیه اصول بهداشتی را رعایت فرمایید. به علت وجود ترشحات از پد بهداشتی استفاده نموده و از استفاده از تامپون خودداری نمایید. جهت جلوگیری از عفونت مجدد از لباس زیر تمیز و نخی استفاده نمایید.
- در طول دوره درمان از مقاربت اجتناب ورزید. توجه داشته باشید در طول مصرف این دارو و تا سه روز پس از پایان درمان، از وسایل جلوگیری کننده از بارداری از جنس لاتکس نظیر کاندوم، دیافراگم و کلاهک دهانه رحم استفاده نکنید. این دارو می‌تواند اثر ضد بارداری آنها را کاهش دهد.
- از مصرف همزمان این دارو با داروهای مهارکننده سیستم عصبی-عضلانی مانند بوتاکس خودداری کنید.

